



Baština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

**Simpozij Učestalost, dijagnostika i terapija
genitalnog karcinoma u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, 08. 06. 2007.**

Šimić, Srećko; Mehmedbašić, Senad

2007

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

<https://bastina.anubih.ba/handle/123456789/868>

Preuzeto s Baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

<https://bastina.anubih.ba/>



AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

POSEBNA IZDANJA
KNJIGA CXXV

Odjeljenje medicinskih nauka
Knjiga 34

SIMPOZIJ
UČESTALOST, DIJAGNOSTIKA
I TERAPIJA GENITALNOG KARCINOMA
U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 08.06.2007.

Uredili

Srećko Šimić
Senad Mehmedbašić


SARAJEVO, 2007.

Petogodišnji retrospektivni pregled (2002.-2006.)


abnormalnih PAPA briseva i patohistoloških nalaza u ZZZZ žena i materinstva u Kantonu Sarajevo

A. Tomić - Cica, M. Kurtović, N. Novičić


Ukupan broj abnormalnih PAPA nalaza 2002 - 2006




Udio HGSIL nalaza u odnosu na ukupan broj pregledanih žena 2002 - 2006



Udio karcinoma u odnosu na ukupan broj pregledanih žena 2002 - 2006




Pregled abnormalnih PH nalaza u 2002. godini



Ukupno uzeto 108 uzoraka za PH analizu ("punch" biopsije i abradati CK-a). Od toga, 10 nalaza nismo dobili (vjerovatno pacijentice same uzele nalaz), a 15 nalaza je bilo sa dijagnozama leukoparakeratoze, akantoze, hiperkeratoze, kondiloma, koilocitoze, cervicitisa, metaplazije ili hiperplazije




Pregled abnormalnih PH nalaza u 2003. godini



Ukupno uzeto 97 uzoraka za PH analizu ("punch" biopsije i abradati CK-a). Od toga, 9 nalaza nismo dobili (vjerovatno pacijentice same uzele nalaz), a 14 nalaza je bilo sa dijagnozama leukoparakeratoze, kondiloma, koilocitoze, cervicitisa, metaplazije ili hiperplazije.


Pregled abnormalnih PH nalaza u 2004. godini



Ukupno uzet 61 uzorak za PH analizu ("punch" biopsije i abradati CK-a).

Od toga, 9 nalaza nismo dobili (vjerovatno pacijentice same uzele nalaz), a 7 nalaza je bilo sa dijagnozama leukoparakeratoze, kondiloma, koilocitoze, cervicitisa, metaplazije ili hiperplazije.


Pregled abnormalnih PH nalaza u 2005. godini



Ukupno uzet 103 uzorak za PH analizu ("punch" biopsije i abradati CK-a).

Od toga, 11 nalaza je bilo sa dijagnozama leukoparakeratoze, kondiloma, koilocitoze, cervicitisa, metaplazije ili hiperplazije, a 2 nalaza su pokazala prisustvo displazije, ali se zbog oskudnosti materijala nije mogao odrediti stepen iste.

Pregled abnormalnih PH nalaza u 2006. godini



Ukupno uzeto 201 uzorak za PH analizu ("punch" biopsije i abradati CK-a). Od toga, 15 nalaza je bilo sa dijagnozama leukoparakeratoze, kondiloma, koilocitoze, cervicitisa, metaplazije ili hiperplazije, 2 nalaza su pokazala prisustvo displazije, ali se zbog oskudnosti materijala nije mogao odrediti stepen iste, a 12 nalaza nedostaje (vjerovatno pacijentice same uzele nalaz)

Pregled abnormalnih PH nalaza u odnosu na broj ukupno uzetih PAPA briseva u periodu od 5 godina (2002. – 2006.)

	Broj	%
LGSIL	77	0.173%
HGSIL	356	0.798%
Invazivni karcinomi	20	0.045%
Mikroinvazivni karcinomi	11	0.025%
Broj uzetih PAPA briseva	44630	

**Pregled abnormalnih PH nalaza u odnosu na broj
ukupno uzetih PAPA briseva u periodu od 5
godina (2002. – 2006.)**

	Broj	%
LGSIL	77	13.51%
HGSIL	356	62.46%
Invazivni karcinomi	20	3.51%
Mikroinvazivni karcinomi	11	1.93%
Ukupan broj uzetih uzoraka za PH analizu	570	100.00%

