



Baština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

**Simpozij Učestalost, dijagnostika i terapija
genitalnog karcinoma u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, 08. 06. 2007.**

Šimić, Srećko; Mehmedbašić, Senad

2007

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

<https://bastina.anubih.ba/handle/123456789/868>

Preuzeto s Baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

<https://bastina.anubih.ba/>



AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

POSEBNA IZDANJA
KNJIGA CXXV

Odjeljenje medicinskih nauka
Knjiga 34

SIMPOZIJ
UČESTALOST, DIJAGNOSTIKA
I TERAPIJA GENITALNOG KARCINOMA
U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 08.06.2007.

Uredili

Srećko Šimić
Senad Mehmedbašić

SARAJEVO, 2007.

**LIJEČENJE PREMALIGNIH I POČETNIH
MALIGNIH PROMJENA GRLIĆA MATERICE U
GINEKOLOŠKO AKUŠERSKOJ SLUŽBI
KANTONALNE BOLNICE ZENICA (1997-2007)**

*Prim. dr Enver Šahović, dr Granić Abdulah, dr Muračević
Bedrana, dr Hodžić Jasmin, dr Knežević Sandra*

Zenica 2007



UVOD

Promjene pločasto-slojevitog epitela grlića materice koje imaju potencijal za malignu transformaciju već mnogo godina su poznate kao cervikalne intraepitelijalne neoplazije (CIN).

Poznavanje prirodnog toka ovih premalignih promjena grlića materice i njihova povezanost sa nastankom invazivnog karcinoma je od najveće važnosti jer postoji vjerovatnoća, da će se u velikog broja pacijentkinja sa ovim promjenama, ukoliko se ne liječe, razviti invazivni karcinom.

CILJ RADA

Cilj istraživanja je analiza liječenja premalignih i početnih malignih promjena grlića materice na ginekološko akušerskom odjeljenju Kantonalne bolnice Zenica od 1997. do 2007. godine.

MATERIJAL I METODOLOGIJA RADA

Analizom su obuhvaćeni podaci iz operativnih protokola svih pacijentkinja liječenih od premalignih i početnih malignih bolesti u periodu od 1997. do 2007. godine.

Na ginekološko akušerskom odeljenju Kantonalne bolnice Zenica od 1997. do 2007. godine. metodom konizacije liječene su 834 pacijentice. Za 296 pacijentkinje nisu bili dostupni postoperativni patohistološki rezultati.




REZULTATI

Tabela 1. prikaz starosne strukture liječenih pacijentica.


Dob (god.)	Broj (n)	%
17-24	25	2,9
25-34	224	26,85
35-44	376	45
45-54	180	21,6
55-80	29	3,5




Slika 1. Citološka analiza liječenih pacijentica




Slika 2. Operativne metode liječenja



Slika 3. Histopatološka analiza liječenih pacijentica



Slika 4. Podaci o prisustvu malignih ćelija na margini i vrhu konusa



Slika 5. HPV nalaz




Tabela 2. Broj operisanih pacijentica u odnosu na pojedine godine.

Godine	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Broj	85	105	100	78	79	73	93	64	74	87
%	11	12,6	12	9,3	9,4	8,7	11	7,6	8,9	10,4

ZAKLJUČAK

- CIN je predominantno bolest žena reproduktivnog doba te je i prosečna starost naših pacijentkinja 37,18 godina (min. 17 a max. 80 godina).
- Kod 513 (96%) pacijantkinja je potvrđena preoperativna dijagnoza a kod 21 (4%) je nađen teži oblik CIN-a.
- Zaključujemo da je tačnost Papa testa za postavljanje indikacije operativnog liječenja CIN-a relevantna u velikom procentu.

- Obzirom na podatak da je samo 3,6% pacijentica koje su predhodno liječene metodom konizacije podvrgnut daljem tretmanu histerektomije, možemo konstatovat da je konizacija metod izbora u liječenju CIN-a.
- Najzastupljeniji je planocelularni karcinom 67,42% .
- 31% pacijentica sa dijagnozom CIN-a je inficirano HPV virusom.
- Podatak o 1,8% pacijentkinja koje su naknadno podvrgnute ponovnoj konizaciji (rekonizaciji) govori o više nego zadovoljavajućem uspjehu operativnog tretmana na ginekološko akušerskom odjelu Kantonalne bolnice Zenica.

